



ن # ق 0

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠: ٢

رقم المبحث: 217

المبحث: العلوم الحياتية

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٤/١/١٣

الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- يُمكن الكشف عن وجود الكربون في المركبات العضوية عن طريق تسخينها مع:

(أ) أكسيد النحاس؛ إذ يُختزل الكربون وينتج (CO_2)

(ب) أكسيد النحاس؛ إذ يتأكسد الكربون وينتج (CO_2)

(ج) هيدروكسيد الكالسيوم؛ إذ يُختزل الكربون وينتج (CO_2)

(د) هيدروكسيد الكالسيوم؛ إذ يتأكسد الكربون وينتج (CO_2)

٢- عدد جزيئات الجلوكوز المكوّنة لثلاثة جزيئات من اللاكتوز يساوي:

(د) 8

(ج) 6

(ب) 4

(أ) 3

٣- العبارة الصحيحة في ما يتعلّق بفصائل الدم بحسب نظامي (ABO) و (Rh)، هي:

(أ) تحتوي بلازما دم شخص فصيلة دمه (AB) على مولدات الضدّ (A) و (B)

(ب) يُمكن لمتبرع فصيلة دمه (O^-) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ مستقبل

(ج) يُمكن لمتبرع فصيلة دمه (AB^+) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ شخص مجهول فصيلة الدم

(د) توجد الأجسام المضادة (Anti-A) و (Anti-B) على سطوح خلايا الدم الحمراء لشخص فصيلة دمه (O^-)

٤- مستوى تركيب بروتين الميوغلوبين:

(د) رباعي

(ج) ثلاثي

(ب) ثانوي

(أ) أولي

٥- جميع العبارات الآتية المتعلّقة بالدهون الثلاثية صحيحة، ما عدا:

(أ) معظم غير المُشبّعة منها تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة

(ب) تتكوّن من اتحاد جزيء غليسرول مع ثلاثة جزيئات من الحموض الدهنية

(ج) عدد مجموعات (OH) الموجودة في جزيء غليسرول يساوي (2)

(د) تتحرر (6) جزيئات من الماء عند تكوّن جزيئين من الدهون الثلاثية

٦- يبيّن الجدول المجاور نسب قواعد نيتروجينية مكوّنة

لجزيء DNA مُستخلص من خلايا مختلفة حصل عليها

باحث في أثناء تجاربه، ما مقدار القيم المفقودة المشار إليها

بالرموز: (W) و (Y) و (Z) على الترتيب؟

مصدر الخلية	الأدينين (A)	السايتوسين (C)	الغوانين (G)	الثايمين (T)
كبد إنسان	W	40	40	
نخاع عظم فأر			Y	23
ورقة نبات دوار الشمس	Z		41	

(د) 20 و 23 و 18

(ج) 10 و 54 و 11


(ب) 20 و 27 و 41

(أ) 10 و 27 و 9

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٧- يشير كل من (س) و(ص) في التفاعل الآتي إلى:




(أ) (س): معقد المالتيز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ب) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ج) (س): معقد المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)

(د) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)



٨- يرمز كل من (X) و(Y) في الشكل المجاور على الترتيب إلى:


(أ) (X): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بوجود إنزيم

(ب) (X): طاقة التنشيط بوجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم

(ج) (X): الطاقة الناتجة من التفاعل، (Y): الطاقة التي يحتاجها التفاعل

(د) (X): الطاقة التي يحتاجها التفاعل، (Y): الطاقة الناتجة من التفاعل

٩- الشكل المجاور يشير إلى إنتاج ADP من ATP، ما الرقم الذي يمثل تحرر الطاقة عند إنتاجه؟



(أ) 1

(ب) 2

(د) 4

(ج) 3

١٠- في التحلل الغلايكولي إذا تحطمت (3) جزيئات من الغلوكوز، فإن عدد جزيئات البيروفيت و(ATP) الناتجة على الترتيب يساوي:

(أ) 3، 6 (ب) 3، 3 (ج) 6، 6 (د) 6، 2

منصة أساسيات التعليمية

١١- نتيجة حدوث سلسلة نقل الإلكترون في التفاعلات الضوئية هي:

(أ) اختزال NADPH لإنتاج NADP^+

(ب) تأكسد NADP^+ لإنتاج NADPH

(ج) تأكسد NADPH لإنتاج NADP^+

(د) اختزال NADP^+ لإنتاج NADPH

١٢- مجموع عدد جزيئات ATP التي تنتج بصورة مباشرة من حلقة كريس وتلك التي تسهم مرافقات الإنزيم الناتجة من الحلقة ذاتها في تكونها بالفسفرة التأكسدية لكل جزيء غلوكوز يساوي:

(أ) 28 (ب) 24 (ج) 26 (د) 30

١٣- الشكل المجاور يبين نواتج أحد أنواع التخمر. أي الكائنات الحية


يحدث فيها هذا النوع، وماذا يمثل الرمز (س) في الشكل على الترتيب؟

(أ) البكتيريا الهوائية، 12CO_2

(ب) فطر الخميرة، 6CO_2

(ج) فطر الخميرة، 12CO_2

(د) البكتيريا اللاهوائية، 2CO_2



يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١٤- أيُّ الثنائيات الآتية هي نواتج التفاعلات الضوئية التي تُستخدم في التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء؟

(أ) $NADPH$ ، ATP (ب) ضوء ، ATP (ج) ATP ، CO_2 (د) $NADPH$ ، H_2O

١٥- كم دورة من حلقة كالفن ستم لتثبيت (12) جزيئاً من CO_2 ، وما عدد جزيئات الجلوكوز التي ستنتج من هذه الدورات على الترتيب؟

(أ) 9 و 2 (ب) 12 و 3 (ج) 6 و 1 (د) 12 و 2

١٦- تُستخدم مادة "سايتارابين" خلال العلاج الكيميائي للقضاء على الخلايا السرطانية؛ إذ تعمل هذه المادة على وقف عملية تصحيح اختلالات DNA في هذه الخلايا. أيُّ مراحل / أطوار الخلية يكون تأثير هذه المادة كبيراً؟

(أ) G_1 (ب) G_2 (ج) S (د) M

١٧- الطوران اللذان تعمل بينهما نقطة المراقبة M هما:

(أ) التمهيدي والاستوائي (ب) الانفصالي والنهاي

(ج) النهائي وانقسام السيتوبلازم (د) الاستوائي والانفصالي

١٨- دَرَسَ باحثٌ خلايا القمم النامية لجذور الثوم وسَجَّلَ أعداد الخلايا في المراحل / الأطوار المختلفة في الجدول المجاور:

المرحلة / الطور	عدد الخلايا
البنية	872
التمهيدي	74
الاستوائي	18
الانفصالي	10
النهاي	8
المجموع	982

ما نسبة الخلايا التي تكون فيها الكروموسومات واضحة ومكوّنة من كروماتيدين شقيقين؟

(أ) 9.4

(ب) 7.5

(ج) 2.8

(د) 1.8

منصة أساس التعليمية

١٩- العبارات الآتية (1 و 2 و 3) تتعلّق بالانقسام الخلوي:

1. ينتج من انقسام خلية واحدة انقسامًا منصفًا 4 خلايا

2. يتفكّك الغلاف النووي في كل من الطور: التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني

3. تتفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها في الطور الانفصالي الأول

أيُّ العبارات السابقة دقيق علمياً؟

(أ) (1) فقط (ب) (2) فقط (ج) (1) و (2) فقط (د) (1) و (2) و (3)

٢٠- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بالانشطار الثنائي، ما عدا:

(أ) تنتج (4) خلايا بكتيريا إذا حدث انشطار ثنائي لخليتي بكتيريا

(ب) يعمل بروتين - يُشبه الميوسين على تحريك الكروموسومين نحو طرفي الخلية

(ج) كروموسوم البكتيريا حلقي يتضاعف في بداية عملية الانشطار

(د) ينغمد الغشاء البلازمي نحو الداخل بالتزامن مع تكوّن الجدار الخلوي

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

٢١- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بآلية تضاعف DNA، ما عدا:

- (أ) يحتاج إنزيم الهليكيز إلى طاقة لتحطيم الروابط بين سلسلتي DNA
(ب) يكون بناء سلسلة DNA المُكملة مُتَّجها دائماً من 5' إلى 3'
(ج) يضيف إنزيم بادئ RNA سلسلة البَدْء التي تتكون من (5-10) نيوكليوتيدات
(د) يعمل إنزيم ربط DNA على إضافة نيوكليوتيدات مُكملة لنيوكليوتيدات السلسلة القالب
- ٢٢- نوع الروابط التي يربط بها إنزيم ربط DNA قطع أوكازاكي بأخرى مجاورة هو:
- (أ) هيدروجينية
(ب) فوسفاتية أحادية الإستر
(ج) فوسفاتية ثنائية الإستر
(د) هيدروجينية وفوسفاتية ثنائية الإستر


٢٣- الإنزيم الذي يعمل على قطع الجزء التالف من سلسلة DNA في أثناء آلية تصحيح استئصال النيوكليوتيد، هو:

- (أ) التيلوميريز
(ب) النيوكلييز
(ج) بلمرة DNA
(د) الهليكيز
- ٢٤- القاعدة النيتروجينية التي تُعدّ المكوّن الأكثر وجوداً في سلسلة تيلومير الإنسان (3' → 5')، هي:
- (أ) الغوانين
(ب) اليوراسيل
(ج) الأدينين
(د) الثايمين

٢٥- أيّ الأرقام في الشكل المجاور تشير إلى الجزء المسؤول عن تعرّف

تسلسل معين من النيوكليوتيدات في DNA والذي يوجد قبل نقطة بدء النسخ؟

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4



٢٦- أيّ الخلايا الآتية تُنتج جاميتات طرازها الجيني (Ab) وجاميتات طرازها الجيني (aB) في نهاية عملية

الانقسام المنصف؟

- (أ) (ب) (ج) (د)

٢٧- في أحد أنواع الحيوانات، يسود أليل لون الفراء الرمادي (H) على أليل لون الفراء الأبيض (h)، ويسود أليل الذيل

الطويل (M) على أليل الذيل القصير (m). إذا تزوج ذكر رمادي الفراء طويل الذيل مع أنثى مجهولة الطراز الشكلي

والجيني وظهر من بين الأفراد الناتجين من هذا التزاوج أفراد بيضاء الفراء طويلة الذيل بنسبة 25%، فإنّ الطرز

الجينية للأبوين للصفاتين معاً:

- (أ) Hhmm، HHMM
(ب) hhmm، HhMM
(ج) hhmm، HhMm
(د) HhMm، HhMm

٢٨- أيّ الآتية النسبة المتوقعة للطرز الشكلية للأفراد الناتجة من تلقيح نبات غير متماثل الأليلات لصفاتين مندليتين

بنبات آخر متّح لهاتين الصفتين؟

- (أ) 3:1
(ب) 9:3:3:1
(ج) 1:2:2:1
(د) 1:1:1:1

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٩- لُقحت نباتات بازلاء صفراء البذور أرجوانية الأزهار (غير متماثلة الأليلات للصفتين) بأخرى لها الطراز الجيني نفسه، فإذا رُمز لأليل البذور الصفراء بالرمز (Y) ولأليل الأزهار الأرجوانية (R) فإن احتمال ظهور نباتات طرازها الجيني YyRR من بين الأفراد الناتجين من هذا التلقيح يساوي:

(أ) $1/16$ (ب) $2/16$ (ج) $3/16$ (د) $4/16$

٣٠- قررت عائلة إنجاب ثلاثة أطفال، ما احتمال أن يكونوا جميعهم ذكوراً؟

(أ) $1/2$ (ب) $1/4$ (ج) $1/8$ (د) $3/8$

٣١- أي الطرز الجينية الآتية لأبوين ينتج من تزاوجهما أفراداً فصيلة دمهم بحسب نظام (MN) هي (MN) فقط، وبحسب نظام (ABO) هي: (A) و (AB) فقط؟

(أ) $(L^M L^M I^A I^A) - (L^M L^N I^A I^B)$ (ب) $(L^M L^N I^A I^A) - (L^N L^N I^B i)$

(ج) $(L^M L^M I^A I^B) - (L^N L^N I^A i)$ (د) $(L^M L^M I^A I^A) - (L^N L^N I^A I^B)$

٣٢- تزوج شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد AAbbCc من فتاة طرازها AaBbCC، ما عدد الطرز الجينية المُحتملة للأبناء التي يكون عدد الأليلات السائدة فيها هو ثلاثة أليلات؟

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

٣٣- مرض المهق العيني ينتج من توارث أليل متنح مرتبط بالجنس يسبب عدم وجود صبغة العين، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف حاد في الإبصار. إذا تزوج شاب مصاب بهذا المرض من فتاة غير مصابة به (متماثلة الأليلات) فإن احتمال إنجابهما ابنة مصابة بالمرض يساوي:

(أ) 0% (ب) 25% (ج) 50% (د) 100%

٣٤- إذا كانت نسبة ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة من حدوث العبور بين الجينات المرتبطة على النحو الآتي:

$(13\% = D - A)$ ، $(2\% = D - G)$ ، $(14\% = G - R)$ ، $(15\% = A - G)$ ، $(12\% = D - R)$ ، فإن الجينين اللذين بينهما

أكبر نسبة ارتباط، هما:

(أ) A, G (ب) G, R (ج) A, R (د) D, G

٣٥- جنس السلاحف الناتجة من فقس بيض خُصن في الرمال في شهور الصيف شديدة الحرارة هو:

(أ) 100% ذكوراً (ب) 100% إناثاً

(ج) 50% ذكوراً و 50% إناثاً (د) 70% ذكوراً و 30% إناثاً

٣٦- جميع حالات طفرة الإزاحة الآتية إذا حدثت في جزيء DNA سينتج عنها تغيير في تسلسل جميع الكودونات بعد

موضع حدوث الطفرة، ما عدا:

(أ) إدخال زوجين من النيوكليوتيدات (ب) حذف زوج من النيوكليوتيدات

(ج) إدخال ستة أزواج من النيوكليوتيدات (د) حذف زوجين من النيوكليوتيدات

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

٣٧- سبب وجود أفراد طرزهم الكروموسومية الجنسية (X) أو (XXY) هو:

- (أ) خلل في أثناء انقسام البويضة المخصبة انقسامًا متساويًا
- (ب) فقد الكروموسومات الجنسية للجاميتات بسبب عملية الإخصاب
- (ج) إخصاب بويضة طبيعية بحيوان منوي أحادي المجموعة الكروموسومية
- (د) عدم انفصال زوج الكروموسومات الجنسية في أثناء تكوين الجاميتات

٣٨- إذا حدث انقسام متساوي لخلية نباتية ثنائية المجموعة الكروموسومية من دون انقسام الميتوبلازم، فإن عدد المجموعة الكروموسومية للخلية الناتجة سيصبح:

- (أ) $2n$
- (ب) $4n$
- (ج) $2n+1$
- (د) $2n+2$


٣٩- سبب زراعة خلايا الجنين المفصولة عن السائل الرهلي هو:

- (أ) التأكد من خلوها من البكتيريا
- (ب) تحديد نسبة الهرمونات فيها
- (ج) تحديد غير الطبيعية منها
- (د) الحصول على كمية كافية منها

٤٠- دَرَسَ باحثٌ نتائجَ فحوصات أجريت لشخص مصاب باختلال وراثي ناتج من حدوث طفرة، والمخطط الكروموسومي المجاور خاصٌ به.

التشخيص المحتمل علميًا للاختلال الذي يعاني منه هذا الشخص هو:

- (أ) التليف الكيسي
- (ب) متلازمة كلاينفلتر
- (ج) متلازمة تيرنر
- (د) متلازمة داون



٤١- أي إنزيمات القطع المحدد الآتية يحوي اسمها سلالة فرعية؟

- (أ) EcoR I
- (ب) BamH I
- (ج) Hind III
- (د) Pst I

٤٢- أدخلت عينة DNA في جهاز الدورية الحرارية بهدف الحصول على (512) نسخة منها، ما عدد الدورات اللازمة لذلك؟

- (أ) 11
- (ب) 9
- (ج) 8
- (د) 7

٤٣- جميع الآتية من التحذيات التي يواجهها استخدام العلاج الجيني، ما عدا:

- (أ) التأكد من أن الجين المرغوب سيكون نشطًا
- (ب) استخلاص خلايا المريض
- (ج) اختيار ناقل مناسب لا يحدث ردود فعل مناعية
- (د) التأكد من اندماج الجين المرغوب في المادة الوراثية للخلية التي تحتاج إليه

٤٤- الترتيب الصحيح لخطوات تجربة العالم ستيفارد لاستنساخ نبات الجزر، بعد تقطيع الجزر الناضج، إلى قطع صغيرة وزراعتها في وسط غذائي هو:

- (أ) تكون البادئة - تكون كتلة غير متميزة - بداية تكون الجذور
- (ب) تكون كتلة غير متميزة - تكون البادئة - بداية تكون الجذور
- (ج) تكون كتلة غير متميزة - بداية تكون الجذور - تكون البادئة
- (د) بداية تكون الجذور - تكون كتلة غير متميزة - تكون البادئة

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٤٥- إذا علمت أن عدد أفراد جماعة حيوية تعيش في نظام بيئي ما يساوي 300 فردًا، وأن نسبة هذه الجماعة في هذا النظام البيئي تساوي 20%، فإن العدد الكلي لأفراد الجماعات الحيوية التي تعيش فيه يساوي:

أ) 1500 ب) 150 ج) 105 د) 15000

٤٦- تُعد جميع الآتية أهمية اقتصادية مباشرة للتنوع الحيوي، ما عدا:

أ) تحليل الفضلات وإعادة تدويرها ب) مصدرًا لمواد تصنيع الملابس

ج) توفير مصادر غذائية متنوعة د) مصدرًا لبعض مكونات العقاقير الطبية

٤٧- إذا علمت أن الأراضي الرطبة في ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية قد حُوّلت إلى أراضٍ لزراعة المحاصيل الغذائية، فإن الطريقة التي أفقدت الجماعات الحيوية التي كانت تعيش هناك موطنها هي:

أ) تدمير الموطن البيئي ب) تجزئة الموطن البيئي ج) التلوث د) الاحتراز العالمي

٤٨- أي الآتية تُعد من نقاط التنوع الحيوي الساخنة؟

أ) منطقة الأغوار ب) الأنهار الجليدية ج) المياه الجوفية د) الشعاب المرجانية

٤٩- جميع الآتية تؤثر سلبيًا في التنوع الحيوي بسبب بناء السدود، ما عدا:

أ) خفض مستويات الماء في الأنهار ب) انخفاض معدلات درجات حرارة الماء

ج) زيادة نمو بعض النباتات والطحالب د) إنتاج خزانات السدود الضحلة كميات كبيرة من الميثان

٥٠- أي الآتية تشمل نواتج الكائنات الحية إضافةً إلى ما ينتج من تحلل الكائنات الميتة من أملاح معدنية ووقود أحفوري؟

أ) السعة التحمّلية ب) المؤشرات الحيوية ج) الزيادة الحيوية د) الموارد الحيوية

منصة أساس التعليمية
«انتهت الأسئلة»

منصة أساس التعليمية

السؤال	الإجابة
26	ب
27	ج
28	د
29	ب
30	ج
31	د
32	ب
33	م
34	ج
35	ب
36	ج
37	د
38	ب
39	د
40	م
41	ج
42	ب
43	ب
44	ج
45	م
46	م
47	م
48	د
49	ب
50	د

أ. أنس أبو صليح
أ. نهى تويبة

السؤال	الإجابة
1	ب
2	م
3	ب
4	ج
5	ج
6	م
7	ب
8	ب
9	د
10	ج
11	د
12	ب
13	ج
14	م
15	د
16	ج
17	د
18	م
19	ج
20	ب
21	د
22	ج
23	ج ب
24	م
25	ج